Journées AFP SVT – 14 janvier 2014

Traçage et datation de la différenciation continentale

Stéphanie Duchene

Université Paul Sabatier

Laboratoire Géosciences environnement Toulouse

Traçage et datation de la différenciation continentale

Les plus anciens témoins de croûte continentale

Les plus anciens témoins de croûte continentale

Gneiss d'Acasta

Bowring and Williams, 1999

**Zircons de granitoïdes
(tonalites et granodiorites)
métamorphiques**

Les plus anciens témoins de croûte continentale

Datations U-Pb

$$^{206}\text{Pb} = \left(^{206}\text{Pb}\right)_0 + ^{238}\text{U} (\exp(\lambda t) - 1)$$

$$^{206}\text{Pb}^* = ^{238}\text{U} (\exp(\lambda t) - 1) \quad (1)$$

Y

$$^{206}\text{Pb}^* / ^{238}\text{U} = \exp(\lambda t) - 1 \quad (2)$$

$$^{207}\text{Pb} = \left(^{207}\text{Pb}\right)_0 + ^{235}\text{U} (\exp(\lambda' t) - 1)$$

$$^{207}\text{Pb}^* = ^{235}\text{U} (\exp(\lambda' t) - 1) \quad (1')$$

X

$$^{207}\text{Pb}^* / ^{235}\text{U} = \exp(\lambda' t) - 1 \quad (2')$$

Courbe concordia

Les plus anciens témoins de croûte continentale

Les plus anciens témoins de croûte continentale

$${}^{207}\text{Pb}^* / {}^{206}\text{Pb}^* = \frac{{}^{235}\text{U} \times (\exp(\lambda' t) - 1)}{{}^{238}\text{U} \times (\exp(\lambda t) - 1)} \quad \frac{(1')}{(1)}$$

$${}^{235}\text{U} / {}^{238}\text{U} = 137.88$$

Y

$${}^{207}\text{Pb}^* / {}^{206}\text{Pb}^* = \frac{1}{137.88} \frac{\exp(\lambda' t) - 1}{\exp(\lambda t) - 1} \quad (3)$$

X

$${}^{238}\text{U} / {}^{206}\text{Pb}^* = 1 / (\exp(\lambda t) - 1) \quad \frac{1}{(2)} \quad \text{Concordia inverse}$$

Les plus anciens témoins de croûte continentale

Les plus anciens témoins de croûte continentale

Concordia inverse . Zircons des gneiss d'Acasta

8 grains d'âge égaux
 4.031 ± 0.003 Ga

Bowring and Williams, 1999

Les plus anciens témoins de croûte continentale

Les plus anciens témoins de croûte continentale

Les zircons de Jack Hill

Cavosie et al., 2004

Les plus anciens témoins de croûte continentale

Wilde et al., 2001

Les plus anciens témoins de croûte continentale

Concordia. Zircons des sédiments de Jack Hills

$^{207}\text{Pb}^*/^{206}\text{Pb}^*$ / $^{207}\text{Pb}^*/^{206}\text{Pb}^*$
age (Myr)

36-1	0.5401 $\pm$ 8	4,355 $\pm$ 2
36-2	0.5353 $\pm$ 10	4,341 $\pm$ 3
36-3	0.5143 $\pm$ 12	4,283 $\pm$ 4
36-4	0.5436 $\pm$ 10	4,364 $\pm$ 3
36-5	0.5163 $\pm$ 13	4,288 $\pm$ 4
36-6	0.5147 $\pm$ 11	4,284 $\pm$ 3
36-7	0.5587 $\pm$ 14	4,404 $\pm$ 4
36-8	0.5272 $\pm$ 9	4,319 $\pm$ 3

(3)

$$^{207}\text{Pb}^* / ^{206}\text{Pb}^* = \frac{1}{137.88} \frac{\exp(\lambda' t) - 1}{\exp(\lambda t) - 1}$$

Les plus anciens témoins de croûte continentale

Conclusions partielles

- Les roches continentales les plus anciennes connues sur Terre à ce jour sont les gneiss d'Acasta (Canada). Ils sont vieux de 4.03 Ga.
- Les minéraux les plus anciens, témoins de la présence de croûte continentale, connus sur Terre à ce jour, sont les zircons de Jack Hills (Australie). Ils sont vieux de 4.2 à 4.4 Ga.
- La croûte continentale a donc commencé à se former moins de 200 Ma après la formation de la Terre.

Suivre l'extraction de la croûte grâce aux isotopes

Suivre l'extraction de la croûte grâce aux isotopes

Spectres de Terres Rares des croûtes continentale et océanique

D'après Rudnick et Fountain (1995)
in White et al. (2001)

Suivre l'extraction de la croûte grâce aux isotopes

Le manteau source des MORB est le réservoir complémentaire de la croûte continentale, il est appauvri en éléments incompatibles (DM - Depleted Mantle).

Suivre l'extraction de la croûte grâce aux isotopes

Courbes d'évolution du Sr

$$\lambda = 1.42 \times 10^{-11} \text{ an}^{-1}$$

$$T = 50 \text{ Ma}$$

	Rb/Sr	$^{87}\text{Sr}/^{86}\text{Sr}$
Croûte continentale	0.15	0.718
Manteau appauvri (DM)	0.006	0.702
Manteau primitif (PM)	0.03	0.745

Suivre l'extraction de la croûte grâce aux isotopes

Suivre l'extraction de la croûte grâce aux isotopes

Modèles d'extraction précoce ou tardive

Suivre l'extraction de la croûte grâce aux isotopes

Modèles d'extraction continue ou instantané

Suivre l'extraction de la croûte grâce aux isotopes

Origine continentale des zircons de Jack Hills

Kemp et al., 2010

Suivre l'extraction de la croûte grâce aux isotopes

Conclusions partielles

- Différents modèles de croissance (continue, épisodique) peuvent être évoqués pour expliquer les compositions isotopiques actuelles de la croûte et du manteau appauvri source des MORB.
- Un réservoir crustal caractérisé par des ϵ_{Hf} et ϵ_{Nd} négatifs, et un réservoir mantellique appauvri caractérisé par des ϵ_{Hf} et ϵ_{Nd} positifs, existent depuis le début de l'histoire de la Terre, témoignant de la présence d'une croûte en quantité significative.
- L'abondance de zircons à $\epsilon_{\text{Hf}} < 0$ depuis la naissance de la Terre montre qu'ils sont eux même formés à partir de la fusion de croûte continentale: c'est le recyclage

L'âge de la croûte et les modèles de croissance

L'âge tectonique de la croûte dans le monde

Artemieva et al., 2006

L'âge de la croûte et les modèles de croissance

Âges des zircons

- Granitoïdes
- Zircons détritiques

L'âge de la croûte et les modèles de croissance

Âges modèles

T_{DM} Nd (Généralement sur roches totales)

L'âge de la croûte et les modèles de croissance

Âges modèles

T_{DM} Hf (Généralement sur zircons)

L'âge de la croûte et les modèles de croissance

Données d'âges U-Pb et de $T_{DM}(Hf)$
sur plus de 13,800 zircons

$T_{DM}(Nd)$ sur la province Nord-Américaine

d'après Bennet et dePaolo (1987)
in White (2001)

D'après Belousova et al. (2010)

L'âge de la croûte et les modèles de croissance

La géochimie des éléments traces

Evolution de la composition en REE de la croûte supérieure

McLennan et Taylor (1982)

L'âge de la croûte et les modèles de croissance

Courbes de croissance

Courbes de croissance obtenues à partir de l'intégration des âges U-Pb et de T_{DM} (Hf) sur plus de 13,800 zircons

Belousova et al. (2010)

L'âge de la croûte et les modèles de croissance

L'âge de la croûte et les modèles de croissance

Conclusions partielles

- Les interprétations récentes sur les zircons ($T_{DM}Hf$, âges U-Pb) tendent à montrer une croissance épisodique, avec des pics de croissance liés à la dynamique globale.
- L'intégration de ces données donne généralement des courbes de croissance montrant une croissance progressive, avec en particulier une adjonction de croûte y compris après l'archéen.

Conclusions

La première croûte s'est formée juste après la naissance de la Terre, il y a plus de 4.3 Ga.

Le modèle classique de croissance crustale, basé sur l'évolution de la composition en REE de la croûte moyenne, les âges U-Pb de la croûte à l'affleurement et l'âge moyen d'extraction (T_{DM}) dans les systèmes Rb-Sr et Sm-Nd, considère une croissance préférentielle à environ 3 Ga. Les données géochronologiques et géochimiques récentes suggèrent cependant:

- qu'un réservoir crustal existe depuis le début de l'histoire de la Terre
- que la croissance crustale a été progressive au cours de l'histoire de la Terre
- que cette croissance a été épisodique, peut-être en lien avec les grands cycles orogéniques

AFPSVT

Association pour la formation des professeurs
de Sciences de la Vie et de la Terre

LA CROUTE CONTINENTALE

Colloque AFPSVT
14 janvier 2014

(Vanderhaeghe, 2008)

LA CROUTE CONTINENTALE

DIVERSITE

LA CROUTE CONTINENTALE

Thème 1-B - Le domaine continental et sa dynamique

En classe de première S, l'attention s'est portée principalement sur les domaines océaniques. On aborde ici les continents. Il s'agit de dégager les caractéristiques de la lithosphère continentale et d'en comprendre l'évolution à partir de données de terrain.

La compréhension de la dynamique de la lithosphère devient ainsi plus complète.

Bilans : granite, gabbro, basalte, péridotite ; le modèle de la tectonique des plaques ; volcanisme, recyclage des matériaux de la croûte ; notions d'érosion, transport, sédimentation.

Thème 1-B-1 La caractérisation du domaine continental : lithosphère continentale, reliefs et épaisseur crustale

La croûte continentale affleure dans les régions émergées. L'examen de données géologiques permet à la fois d'expliquer cette situation et de nuancer cette vision rapide.

Les mécanismes de formation des montagnes sont complexes. On se limite au cas des reliefs liés à un épaissement crustal dont les indices peuvent être retrouvés sur le terrain et/ou en laboratoire.

Thème 1-B-2 La convergence lithosphérique : contexte de la formation des chaînes de montagnes

Si les dorsales océaniques sont le lieu de la divergence des plaques et les failles transformantes une situation de coulissage, les zones de subductions sont les domaines de la convergence à l'échelle lithosphérique. Ces régions, déjà présentées en classe de première S, sont étudiées ici pour comprendre une situation privilégiée de raccourcissement et d'empilement et donc de formation de chaînes de montagnes.

Thème 1-B-3 Le magmatisme en zone de subduction : une production de nouveaux matériaux continentaux

Les zones de subduction sont le siège d'une importante activité magmatique qui aboutit à une production de croûte continentale.

Thème 1-B-4 La disparition des reliefs

Tout relief est un système instable qui tend à disparaître aussitôt qu'il se forme. Il ne s'agit évidemment pas ici d'étudier de façon exhaustive les mécanismes de destruction des reliefs et le devenir des matériaux de démantèlement, mais simplement d'introduire l'idée d'un recyclage en replaçant, dans sa globalité, le phénomène sédimentaire dans cet ensemble.

Thème 2 - Enjeux planétaires contemporains

Thème 2-A - Géothermie et propriétés thermiques de la Terre

L'énergie solaire, d'origine externe au globe terrestre, a été largement abordée dans les programmes de sciences de la vie et de la Terre des classes de seconde et de première. Un flux thermique dont l'origine est interne se dirige aussi vers la surface. L'étudier en classe terminale est à la fois prendre conscience d'une ressource énergétique possible et un moyen de comprendre le fonctionnement global de la planète.

Bilan : flux thermique, convection, conduction, énergie géothermique.

LA CROUTE CONTINENTALE

14 janvier 2014

Bonne journée
d'échanges !

- 10h15 : **Stéphanie DUCHENE** - PU Université Paul Sabatier, Toulouse
Traçage et datation de la différenciation continentale
- 11h00 : **Jean-François MOYEN** - PU Université Jean Monnet, St Etienne
Processus de formation et de différenciation de la croûte continentale
- 11h45 : **Olivier VANDERHAEGHE** - PU Université de Lorraine, Nancy
Montagnes : Colosses au cœur tendre ; Le cycle orogénique dans le cadre de la tectonique des plaques
- 14h00 : **Philippe GONCALVES** - MC Université de Franche-Comté, Besançon
Les roches métamorphiques: un marqueur des perturbations thermiques de la croûte continentale
- 14h45 : **Cécile ROBIN** - MC Université de Rennes 1, Rennes
Les bassins sédimentaires, archives des déformations lithosphériques
- 16h00 : **Siegfried LALLEMANT** - PU Université de Cergy-Pontoise, Cergy-Pontoise
L'évolution du concept d'isostasie et son rôle dans la perception de la résistance de la croûte et du manteau
- 16h45 : **Michèle PRIEUR** - Chargée d'étude et de recherche à l'Institut Français de l'Education - ENS, Lyon
& **Eric SANCHEZ** - MC Institut Français de l'Education - ENS Lyon
*Classe de terrain, investigation, jeux ...
Un bilan de recherche pour concevoir des démarches innovantes dans la classe*

Processus de formation et de différenciation de la croûte continentale

Jean-François Moyen

Composition de la croûte ?

La croûte supérieure : échantillonnage par les rivières

Table 2.8. Chemical composition of particulate matter from selected rivers [51].

	Amazon	Congo	Ganges	Garonne	Mekong
SiO ₂	60.1	58.0	66.9	58.2	61.9
TiO ₂	1.3	1.6	0.96	0.84	0.63
Al ₂ O ₃	22.8	25.0	16.0	22.4	22.3
FeO	7.5	10.4	5.2	7.5	7.6
MnO	0.14	0.20	0.14	0.22	0.13
MgO	2.0	1.1	2.3	2.9	2.3
CaO	2.3	1.4	4.1	2.7	0.87
Na ₂ O	1.2	0.32	1.5	0.75	0.74
K ₂ O	2.1	1.6	2.7	4.1	3.0
Σ	99.6	99.6	99.8	99.6	99.5
Cs	13	6	8.2	—	21
Ba	700	790	490	615	600
Rb	138	60	116	—	190
Sr	309	61	—	164	92
La	48	50	42	44	48
Ce	112	90	98	93	93
Pr	—	—	—	8.2	8.5
Nd	—	—	48	36	47
Sm	9.7	—	9.7	6.2	5.4
Eu	1.8	1.6	1.2	1.1	1.5
Gd	—	—	—	6.1	5.3
Tb	—	1.6	0.7	0.9	0.9
Hu	—	—	—	0.9	0.9
Er	—	—	—	2.4	2.7
Tm	—	—	0.35	0.44	0.45
Yb	3.7	2.6	3.2	2.8	3.2
Lu	0.6	0.37	0.51	0.42	0.58
ΣREE	—	—	—	207	222
La _N /Yb _N	8.6	13.0	8.9	10.6	10.1
Eu/Eu*	0.57	0.47	0.51	0.54	0.85
Th	13	16.2	17.5	13	17
U	2.5	3	2.8	3.6	5.8
Hf	6.2	5.1	8.4	—	4.0
Ta	2.0	1.1	1.25	—	1.35
Th/U	5.2	5.4	6.3	3.6	2.9
La/Th	3.7	3.1	2.4	3.4	2.8
Cr	193	175	71	255	102
V	232	163	—	150	175
Sc	18	12	11.5	—	19.5
Ni	105	74	80	33	99
Co	41	25	14	39	20
Ga	19	25	—	16	28
La/Sc	2.7	4.2	3.7	—	2.5
Th/Sc	0.72	1.4	1.5	—	0.87
B	68	43	—	120	87

Croûte supérieure moyenne (Rudnick et Gao)			
oxydes pds %		Minéraux normatifs	
SiO ₂	66.6	Q	21.258
Al ₂ O ₃	15.4	C	0.462
FeO	5.04	Or	16.547
MgO	2.48	Ab	27.67
CaO	3.59	An	17.811
Na ₂ O	3.27	Di	0
K ₂ O	2.8	Hy	15.432

Et la croûte inférieure ?

Exemple: Kapuskasing, Canada

	oxydes pds %				Mnx normatifs		
	Crt sup	Crt inf	Crt globale		Crt sup	Crt inf	Crt globale
SiO2	66.6	54.33	60.60	Q	21.26	7.48	11.17
Al2O3	15.4	15.30	15.90	C	0.46	0.00	0.00
FeO	5.04	10.60	6.70	Or	16.55	2.01	10.70
MgO	2.48	3.50	4.66	Ab	27.67	23.69	25.98
CaO	3.59	8.49	6.40	An	17.81	28.18	24.26
Na2O	3.27	2.80	3.07	Di	0.00	11.85	6.21
K2O	2.8	0.34	1.81	Hy	15.43	22.16	20.83

CROÛTE SUPERFICIELLE

Roches sédimentaires et volcaniques

CROÛTE SUPERIEURE

Roches métamorphiques
et granitoïdes

CROÛTE INFÉRIEURE

Roches métamorphiques (granulites)
et roches intrusives

MOHO

MANTEAU SUPERIEUR

Péridotites

Modèle andésitique

Mais... Le flux entrant est plutôt basaltique !

Le (paléo)arc du Kohistan, Pakistan

Différentiation de la croûte d'arc au Kohistan

La croûte du Massif Central

A la source aussi...

Une croûte partiellement fondue !

Si on enlève des granites, il reste...

Enclaves à Bournac
(Miocène)

Rossi et al 2006

Effondrement gravitaire et retour à l'équilibre

Pure flattening of ductile layer accommodated by vertical motion of passive lid

Gravitational collapse by lateral spreading of ductile crust and adjustment of topography

Lateral sliding of brittle crust
Upwelling of ductile crust

Gravitational collapse by lateral sliding of upper crustal units and upwelling of ductile crust

Plateau du Colorado

Délamination de la croûte inférieure (et du manteau lithosphérique)

Cycle de Wilson

J. Tuzo Wilson
1908 – 1993

Chronologie de la croissance crustale

La croûte moderne est recyclée

.. Et la croûte ancienne ?

Comparison of the size of several greenstone belts

All maps at the same scale (1/3 000 000), with the same symbology. Background: 1/1 000 000 geological map of France for comparison.

- Younger cover
- Granitoids
- Greenstones

Kilometers
0 12.5 50 75 100

Part of the Abitibi, Ontario, Canada

TAS (Le Bas et al. 1986)

- Crt Archéenne = basaltes + TTG
- Différentiation minime, la crt à l'affleurement représente la croûte totale
- Granitoïdes juvéniles ($\neq$ moderne !)

Gneiss gris et TTG

quartz

epidote

plagioclase

biotite

Archaean TTG

Modern granites

Données expérimentales

Traces dans liquides expérimentaux

Geodynamic site ?

Subduction

Intermediate cases:

- Shallow subduction ($\pm$ underplating)
- Stacked oceanic crust

Thick (oceanic or continental) crust
(e.g. Oceanic plateau)

Subduction chaude?

TODAY

ARCHAEAN

Croûte Archéenne

- Largement juvénile
- Mal stratifiée
 - Granitoïdes TTG
 - Basaltes
- Granitoïdes primitifs TTG

Croûte moderne

- Largement recyclée
- Bien stratifiée
 - Couverture sédimentaire
 - Granites et gneiss
 - Granulites « résiduelles »
- Granitoïdes différenciés et/ou remaniement

Archaean tectonics : 4400/4000 (?) - 3000 Ma

■ Oceanic crust
□ Continental crust

🔥 Juvenile continental magmatism

Late-Archaean tectonics : 3000 - 2500 Ma

■ Oceanic crust
□ Continental crust

🔥 Juvenile continental magmatism

Present-day tectonics : 2500 Ma - today

■ Oceanic crust
□ Continental crust

🔥 Juvenile continental magmatism

Merci !

Août 2010 – Les difficultés de l'étude de la croûte Archéenne

MONTAGNES : COLOSSES AU CŒUR TENDRE

Olivier VANDERHAEGHE
olivier.vanderhaeghe@univ-lorraine.fr

Le Massif du Mont Blanc, Chaîne Alpine

Des pionniers...

(De Saussure, 1779
Voyages dans les Alpes)

Des pionniers...

Coupe des Alpes

PLATE I.

(Argand 1911)

Schéma d'évolution tectonique

Les montagnes se soulèvent en réponse à la collision des continents ...

Modélisation analogique

(Henry M. Cadell, 1889)

Experiments in mountain building

...à la tectonique du camembert!

...mais la croûte ramollie flue sous l'effet de la gravité!

De la dérive des continents...

Les continents forment le “SiAl”
et se déplacent sur le “SiMa”

(Wegener, 1912)

...à la tectonique des plaques.

(Isacks et al., 1968; Le Pichon, 1968; Morgan, 1968)

La lithosphère (croûte + manteau lithosphérique) est subdivisée en une douzaine de plaques qui se déplacent par rapport à l'Asthénosphère

Chaînes de montagnes?

Tectonique des plaques

Subduction/Collision

La convergence est accommodée par subduction

La subduction est suivie de la collision

La croûte continentale n'est pas assez dense pour subduiter

(Mc Kenzie, 1969)

Tectonique des plaques et orogénèse

Enregistrement géologique de la transition subduction/collision

(Dewey & Bird, 1970)

Chaînes de collision : Alpes-Himalayas

Chaînes de Subduction : Cordillères

Sédimentation:

Flysch/Molasse

Déformation:

Ophiolites/Nappes

Métamorphisme:

Schistes bleus-Eclogites HP/BT

Métamorphisme:

- **Schistes bleus-Eclogites HP/BT**

- **Amphibolites (Migmatites) HT**

Magmatisme

Le paradigme actuel

Formation des chaînes de montagnes:

- Collision continentale
 - Accrétion magmatique
- le long des zones de convergence de plaques

Cordillères Ouest Pacifique: *Mariannes*

Cordillères Est Pacifique: *Andes*

Chaînes de collision: *Himalayas-Tibet*

Le paradigme actuel

Formation des chaînes de montagnes:

Collision continentale (à l'échelle crustale):

- Poinçonnement rigide et extrusion latérale accommodée par déformation localisée
- Corrélation entre cinématique des plaques et déformation continentale

(Tapponnier & Molnar, 1985)

(Tapponnier et al. 1982)

La gravité n'est pas prise en compte!

Le paradigme actuel

Formation des chaînes de montagnes:

Collision continentale (à l'échelle lithosphérique)

①a Homogeneous thickening

(Houseman et al., 1981;
Houseman & Molnar, 1997)

②a Subduction

(Mattauer, 1986)

①b Convective instability

②b Break-off, delamination

(Bird, 1979;
Davies & Von Blanckenburg, 1995)

Le paradigme actuel:

Destruction des montagnes:

Erosion et rebond isostatique

Montagnes jeunes
Alpes, Massif des Ecrins

a Mountain building

b Erosion and root rebound

Pénéplaine:
Socle Précambrien de Madagascar

Le cycle orogénique de Wilson

Evolution thermomécanique des orogènes

(Escher, 1997)

Genèse et exhumation de roches HP/BT

Evolution thermomécanique des orogènes

Fusion partielle de la croûte continentale

Massif Central Français

Pénéplaine Varisque:

- Précoce (~ 290 Ma)
- Érosion insuffisante

Evolution thermomécanique des orogènes

Extension de la croûte orogénique

Metamorphic Core Complex

(Buck, 1991)

Force gravitaire

crustal wedge

Evolution thermomécanique des orogènes

Resultats :

- Subduction continentale (UHP)
- Fusion partielle (migmatites)
- Extension de la croûte orogénique

Questions :

- Transition géotherme faible/fort ?
- Transition épaisseur/amincissement ?
- Exhumation des roches métamorphiques ?

Bilan des forces

Bilan thermique

(Vanderhaeghe, 2012)

Topographie des zones de convergence

Prisme orogénique

(Vanderhaeghe, 2012)

Plateau orogénique

Bassin intermontagneux

La chaîne alpine s.l.

Convergence Afrique/Eurasie

Alpes :
Prisme orogénique

Tibet :
Plateau orogénique

Egée :
Bassin intermontagneux

ALPES :

Formation d'un prisme orogénique

Alpes: prisme orogénique

Zone externe:

Décollement couverture/socle

Zone interne:

Nappes HP/BT

Plusieurs sutures

Avant-Pays:

Bassin flexural avec sédiments détritiques

Structure profonde:

Subduction Eurasie sous Afrique

Alpes: prisme orogénique

Tomographie sismique : Un seul slab alpin

$$V_p = \sqrt{\frac{(4/3)\mu + k}{\rho}}$$

$$V_s = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}$$

G

Alpes: prisme orogénique

Bassin flexural

Sédiments: continentaux

Sédiments marins

Diachronisme:
Exhumation/Erosion

(Ford et al. 2006)

Convergence rapide

1,5 cm/yr

oceanic

75 Ma

35 Ma

Convergence lente

0,5 cm/yr

continental

30 Ma

Retreat ?

20 Ma

0 Ma

Formation d'un prisme orogénique HP/BT:
Enfouissement/Exhumation :

- ~~Erosion~~
- Slab retreat ?

TIBET :

Development d'un plateau orogénique

Tibet: plateau orogénique

Structure Crustale

- Plateau

(Argand, 1924)

Structure Lithosphérique

- Racine

(England & Houseman, 1988)

- Slab

(Mattauer, 1986;
Molnar, 1988)

Tomographie

(Van der Voo et al., 99)

- Slab retourné?

Tibet: plateau orogénique

Des roches métamorphiques de HP/BT

(Le Fort, 1988)

(de Sigoyer et al., 2004)

(Dezès 1999)

Tibet: plateau orogénique

Des migmatites, témoins de la fusion partielle (HT)

Orthogneiss Migmatitique
Reru Valley, NW India (Courtesy, Weinberg R.)

Paragneiss Migmatitique
Reru Valley, NW India (Courtesy, Weinberg R.)

Tibet: plateau orogénique

Des migmatites et leucogranites témoins de la fusion partielle (HT)

(Weinberg and Searle, 1999)

Tibet: plateau orogénique

Une zone partiellement fondue sous le Tibet

Sismologie

Atténuation des ondes sismiques

(Phillips et al., 2000)

(Nelson et al., 1996)

Faible vitesse
Forte reflectivité
(Forte conductivité)

(Nelson et al., 1996; Vanderhaeghe & Teyssier, 2001)

- Fluage latéral de la croûte partiellement fondue
- Ségrégation et migration vers le haut des liquides granitiques

Tibet: plateau orogénique

Une zone partiellement fondue sous le Tibet

(Zhang et al., 2004)

EASTERN TIBETAN PLATEAU

(Royden et al., 1997
Clarke et al., 2004)

- Propagation latérale du plateau orogénique
- Fluage autour des noyaux cratoniques rigides

EGEE :

Bassin intermontagneux

Egée

- Sutures océaniques, blocs continentaux
- Pas de montagnes!
- Chevauchements et failles normales
- Métamorphisme HP/LT et HT
- Bassins d'avant-pays et fossés d'effondrement
- Magmatisme d'arc migrant vers le Sud

(Vanderhaeghe et al., 2007)

Egée: Naxos

Egée: Naxos

Foliation HP/BT pentée transposée dans foliation plate MT à HT

Egée: Naxos

(Vanderhaeghe, 2004
Vanderhaeghe et al., 2007
Kruckenberg et al., 2010, 2011)

Egée: Naxos

Metagabbro

- **Coeur hérité:** 260 Ma
- **Recristallisation HP:** 58 Ma
- **Recristallisation HT:** 16 Ma

(Vanderhaeghe, 2004
Martin et al., 2006;
Duchêne et al., 2006;
Martin et al., 2008
Seward et al., 2009)

60-45 Ma : Accretion

(Vanderhaeghe et al., 2007)

30-25 Ma : Maturation

25-10 Ma : Collapse

Retreat

Crete

Cyclades

HP

HT

HP: 20 Ma

HP: 60-45 Ma
HT: 30-17 Ma

HP > 70 Ma ?
HT: 40-30 Ma

Retreat

Convergence: Accretion / Maturation / Effondrement

Evolution thermomécanique des orogènes

Alpes (Prisme orogénique) :

- Convergence: subduction/accrétion
- Géotherme faible

Tibet (Plateau orogénique) :

- Fluage gravitaire d'une croûte inférieure à faible viscosité

Egée (Bassins intermontagneux) :

- Accrétion d'unités HP/LT
- Maturation thermique
- Effondrement gravitaire d'une croûte ramollie

Cycle orogénique

Réponses :

- Transition géotherme faible/fort ? :
- Transition épaissement/amincissement ? :
- Exhumation des roches métamorphiques ? :

Relaxation thermique post-épaississement
Changement de la cinématique des plaques
Erosion et surtout extension

Bon camembert!

Earth dynamics and plate tectonics

Earth topography

<http://www.ngdc.noaa.gov/>

Earth topography:

- Continental plains, mountain belts, basins
- Oceans : abyssal plains, ridges, trenches
- Mass distribution within the Earth
- Distinction continents/oceans

Earth dynamics :

- Mass redistribution
- Modifications of surface topography

Oceanic lithosphere
Continental lithosphere

$$V_p = \sqrt{\frac{(4/3)\mu + k}{\rho}}$$

$$V_s = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}$$

Lithosphere definitions

$$V_p = \sqrt{\frac{(4/3)\mu + k}{\rho}}$$

$$V_s = \sqrt{\frac{\mu}{\rho}}$$

Lithosphere:

- Mechanical
- Thermal
- Chemical

Strong
Conductive
Dense } Compared to asthenosphere

- Plate tectonics
- Mantle-scale mass redistribution

Earth dynamics and plate tectonics

Oceans:

Oceanic ridges:

- Young lithosphere
- High surface heat flux

Oceanic trenches:

- Old lithosphere
- Low surface heat flux

Age of the oceanic lithosphere

(Müller et al., 97)

Surface heat flux

Earth dynamics and plate tectonics

Ocean's topography :

- Lithospheric thickness

<http://www.ngdc.noaa.gov/>

Earth dynamics and plate tectonics

Ocean's topography :

- Lithospheric thickness

Ridges:

- Plate divergence
- Thinning

Trenches:

- Plate convergence
- Subduction

Earth dynamics and plate tectonics

Continents

Mountain belts :

- Thick crust
- High surface heat flux

Rifts:

- Thin crust
- High surface heat flux

Crustal thickness

(Bassin et al., 00)

Surface heat flux

(Artemieva & Mooney, 01)

Earth dynamics and plate tectonics

Continental plains (old cratons) :

- Thick lithosphere
- Low surface heat flux

Rifts and mountain belts :

- Thin lithosphere
- High surface heat flux

Continents' topography :

- Crust/lithosphere thickness ratio

Thermal lithosphere

Surface heat flux

(Artemieva & Mooney, 01)

Plate tectonics

Formation and evolution of the continental crust

Plate convergence :

- Magmatic accretion
- Tectonic accretion
- Crustal thickening

<http://www.ngdc.noaa.gov/>

Plate tectonics and orogeny

Convergent plate boundaries:

- Subduction
- Tectonic accretion
- Magmatism

(Vanderhaeghe, 2012,
after Karason & van der Hilst; 2000; Li et al., 2008 and Grip and Gordon 2002)

Plate tectonics and orogeny

Crustal behaviour

(Vanderhaeghe & Duchêne, 2010)

Convergent plate boundaries:
Plate kinematics

(Vanderhaeghe & Duchêne, 2010)

Plate tectonics and orogeny

(a) Crust/mantle coupling and slab advance

(c) Crust/mantle coupling and slab retreat

(b) Crust/mantle decoupling and slab advance

(d) Crust/mantle decoupling and slab retreat

Observables :

- Topography
- Suture
- crust/mantle thickness ratio
- Surface heat flux

→ Hot and buoyant wedge

(Vanderhaeghe & Duchêne, 2010)

Topography along convergent plate boundaries

① Orogenic wedges

(Vanderhaeghe, 2012)

Topography along convergent plate boundaries

(b) Orogenic plateaus

(Vanderhaeghe, 2012)

Topography along convergent plate boundaries

(Vanderhaeghe, 2012)

© Intermontane basins

Topography along convergent plate boundaries

(a) Orogenic wedges

(b) Orogenic plateaus

(c) Intermontane basins

(d) Topography of orogenic belts

(Vanderhaeghe, 2012)

Orogenic crust thermomechanics

Extension of orogenic crust

(Coney & Harms, 1984
Dewey, 1988)

Pure Shear
McKenzie, 1978

Simple shear
Wernicke, 1981

Kinematic approach

3D geometry of Tethyan slabs : Seismic tomography

(Wortel & Spakman, 2000)

- Three retreated slabs
- Lateral and longitudinal discontinuities
- Accumulation at 400-600 km

Western Alps

Crustal balance

Continental crust since collision (50 Ma) :

$$500 \times 30 = 15\,000 \text{ km}^2$$

Crustal wedge :

$$[200 \times (5 + 25)] : 2 = 3000 \text{ km}^2$$

Exhumation :

$$GS: 30 \times 20 = 600 \text{ km}^2$$

$$BS: 30 \times 45 = 1350 \text{ km}^2$$

$$E: 30 \times 68 = 1990 \text{ km}^2$$

$$\text{Total} = 3990 \text{ km}^2$$

Sediments :

1000 km² (England, 1981)

Convergence vs Accretion :

$$15\,000 - (3000 + 1000) = 11\,000 \text{ km}^2$$

$$\rightarrow \text{Continental subduction} : 11\,000 : 30 = 366 \text{ km}$$

Exhumation vs Sedimentation :

$$3990 - 1000 \sim 3000 \text{ km}^2$$

$$\rightarrow \text{Slab retreat} : 3000 : 30 = 100 \text{ km}$$

(Vanderhaeghe et al., in prep.)

Crustal structure

Crustal extension

Rigid extrusion

(Gautier et al., 1999; Jolivet et al., 2001)

0. Etat initial

1. Epaissement homogène instantané

2. Relaxation thermique

2. Relaxation thermique

3. Amincissement homogène instantané

4. Relaxation thermique

Gravity versus « tectonic » control on crustal deformation

Buck and Sokoutis, 1994
 Medvedev, 2002
 Vanderhaeghe et al., 2003

Wedge-plateau transition

- T increase during convergence: Radioactive heat production
- Wedge/plateau transition: Thermally controlled genesis of a weak lower crust

(Vanderhaeghe & Teyssier, 2001
 Vanderhaeghe, et al., 2003)

Crustal extension and Metamorphic Core Complex

- Brittle fracturing of upper crust
- Ductile flow of lower crust (lateral and upward)

(Rey et al, 2009)

Flow modes of weak partially molten crust

Driven by « tectonic »
and/or gravity forces

Buoyancy-driven

① Accretionary wedge

② Continental plateau

(Vanderhaeghe 2009)

③ Gravitational collapse

...à la tectonique des plaques.

La lithosphère (croûte + manteau lithosphérique) est subdivisée en une douzaine de plaques qui se déplacent par rapport à l'Asthénosphère

(Isacks et al., 1968; Le Pichon, 1968; Morgan, 1968)

Schematic sections showing plate, ocean, continent, island arc relationship. The ? developing trench indicated in (G) is from *Sykes [1970]*.

FIGURE 1. Schematic illustration of the Wilson cycle, the evolution of oceans, in the framework of lithosphere plate evolution. (Adapted from Bird and Dewey, 1970, Fig. 9)

E-Tibet :
Active tectonics
and
lithospheric structure

(Chamot-Rooke & Rabaute, 2006)

(Burchfiel et al., 2008)

- Limited active surface shortening
- Abrupt Moho offset and topographic step
- Lateral variations of lithospheric structure
- Smooth lithospheric flexure

(Robert et al., 2009)

(Vanderhaeghe et al., 2007)

Vanderhaeghe, 04
 Martin et al., 06;
 Duchêne et al., 06;
 Martin et al., 08
 Seward et al., 09

Le prisme d'accrétion orogénique alpin:
Métamorphisme SB/SV et microstructure

4.2. Le prisme d'accrétion orogénique alpin: Métamorphisme et structure

4.2. Le prisme d'accrétion orogénique alpin:

Métamorphisme et structure

(Gidon et al., 1975

Schwartz, 2000)

Eclogite (UHP)

Greenschists

Blueschists

FLYSCHS A
HELMINTHOIDES

BRIANÇONNAIS

PIÉMONTAIS

DORA MAIRA

VISO

Déformation polyphasée, plis couchés isoclinaux replissés

Contact Briançonnais/Piémontais précoce par rapport au replissement et au facies schistes verts

Marge apulienne faiblement déformée

Les roches métamorphiques : un marqueur des perturbations thermiques de la croûte continentale

Philippe Goncalves

Univ. Franche-Comté

UMR Chrono-Environnement

25000 Besançon

philippe.goncalves@univ-fcomte.fr

fantôme de sillimanite

réaction métamorphique $\text{opx} + \text{sill} = \text{spr} + \text{crd}$

Répartition des roches métamorphiques dans la croûte continentale

Roches métamorphiques = constituant majeur de la croûte continentale

Faure et al. (2009)

Fig. I.3. Le Massif Central français et ses grandes unités principales (modifié d'après Ledru et al. 1989).

Les roches métamorphiques : un marqueur des perturbations thermiques de la croûte continentale (oui mais pas forcément)

fantôme de sillimanite

réaction métamorphique $\text{opx} + \text{sill} = \text{spr} + \text{crd}$

1. Relations entre évolution thermique de la croûte et métamorphisme

La structure thermique de la croûte continentale

Le gradient géothermique : $T(z)$ ou $T(P)$ avec $P = \rho \cdot g \cdot z$

Le gradient géothermique

- Le calcul d'un gradient géothermique découle de l'équation générale de flux de chaleur (1D)

$$\frac{\partial T}{\partial t} = \frac{A}{c \cdot \rho} + \kappa \cdot \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} - u_z \cdot \frac{dT}{dz}$$

Production de chaleur

transfert par conduction

transfert par advection

c : chaleur spécifique (quantité de chaleur nécessaire pour élever la température d'un corps de masse donné de 1°)

ρ : densité

A ($\text{W} \cdot \text{m}^{-3}$): production ou consommation de chaleur interne

κ : diffusivité thermique (m^2/s)

u_z : vitesse de déplacement vertical d'un point

Gradient géothermique stationnaire

- un gradient géothermique stationnaire s'applique *aux zones stables* de la croûte
- un système perturbé (épaississement de la croûte dû à une collision continentale) tendra toujours *à évoluer vers cet état stationnaire*

Il implique donc :

- absence de changement de T d'un point au cours du temps soit

$$\frac{dT}{dt} = 0$$

- épaisseur de croûte constante (30-35 km) sans mouvements verticaux de type exhumation

$$u_z = 0$$

$$0 = \frac{A}{c \cdot \rho} + \kappa \cdot \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} \quad \text{avec} \quad \kappa = \frac{k}{c \cdot \rho} \quad \text{on a}$$

$$\frac{\partial^2 T}{\partial z^2} = -\frac{A}{k}$$

Equation d'un gradient
géothermique stationnaire

Résolution (Spear, 1993)

Pour $z \leq D$

$$T = \frac{-A \cdot z^2}{2k} + \frac{Q^* \cdot A \cdot D}{k} \cdot z + 0$$

Calcul d'un gradient géothermique stationnaire moyen

géotherme moyen

$$K = 2.25 \text{ W.m}^{-1}\text{.K}^{-1}$$

$$A = \text{mW.m}^{-3}$$

$$Q^* = 30 \text{ mW.m}^{-2}$$

$$D = 35\text{km}$$

moho

Solidus hydratée
(systèmes pélitiques)

Perturbation du gradient géothermique stationnaire

Si la croûte subit une *perturbation thermique* par

- des apports locaux de chaleur (intrusion magmatique)
- des contraintes tectoniques (épaississement crustal)

alors...

$$\frac{dT}{dt} \neq 0 \quad \frac{\partial T}{\partial t} = \frac{A}{c \cdot \rho} + \kappa \cdot \frac{\partial^2 T}{\partial z^2} - u_z \cdot \frac{dT}{dz}$$

$U_z \neq 0$

Perturbation du gradient géothermique stationnaire : modèle d'épaississement homogène

Relation entre évolution du gradient géothermique et trajet P-T

Les roches métamorphiques n'enregistrent pas directement l'évolution du gradient géothermique mais plutôt des portions de trajet P-T

Rôle du géologue :

- reconstruire ces trajets P-T
- déduire le contexte géodynamique

La forme et position des trajets P-T = f(nature de la perturbation, position initiale de la roche, vitesse de relaxation thermique et de déplacements verticaux, ...)

**2. Pourquoi et comment les roches métamorphiques
enregistrent-elles l'évolution P-T ?**

2. Pourquoi et comment les roches métamorphiques enregistrent-elles l'évolution P-T ?

Métamorphisme et Thermodynamique sont intimement liés

une réaction chimique (métamorphique) correspond à un réarrangement d'atomes accompagné de transferts d'énergie suite à un changement des conditions environnementales du système = thermodynamique

Une roche = système thermodynamique (ouvert ou fermé) qui tend toujours vers un équilibre en minimisant son énergie interne

Un système thermodynamique (roche) est à l'équilibre :

(1) s'il n'a aucune de ses propriétés qui changent avec le temps

(2) s'il est perturbé (c'est à dire soumis à des gradients de quelque nature que ce soit (P, T, chimie), reviendra spontanément à son état d'équilibre (par élimination des gradients).

Un système peut-être défini sous 3 états : stable, métastable et instable

Figure 2.3 Four positions of a ball on a surface, to illustrate the concept of equilibrium. Position a – metastable equilibrium. Position b – unstable. Position c – unstable. Position d – stable equilibrium.

Anderson, 2005

d. stable = le système est à l'équilibre et dans son état d'énergie minimum

a. métastable = système à l'équilibre mais dans une configuration d'énergie non minimum

a. et d. vérifie bien la définition de l'équilibre thermodynamique

b. et c. instable = système en déséquilibre

exemple de métastabilité : les roches de HP aux conditions atmosphériques

Dans les conditions d'observations (20° C et 1 bar), cette eclogite est métastable. la paragenèse grt-cpx-q subsiste en dehors de son champ de stabilité

Le système est en équilibre mais pas dans sa configuration d'énergie minimum

Le passage à un état stable ne se fera que si les barrières cinétiques sont franchies

Les réactions métamorphiques

Les réactions métamorphiques affectant une roche suite à des variations de P et T répondent à une nécessité thermodynamique: la **minimisation de l'énergie libre** (Gibbs)

eclogite
(grt-omph-qtz-ru)

amphibolite à fantôme de grt
(amph - pl)

diminution de P
cpX grt q V = amph pl

<http://christian.nicollet.free.fr>

les réactions polymorphiques

changement de structure cristallographique d'un minéral sans variation chimique de sa composition ($A = B$)

transformations isochimiques qui ne dépendent que de P et T = bons marqueurs thermobarométrique

- exemple des silicates d'alumines

orthorhombique

<http://www.indiana.edu/>

triclinique

orthorhombique

réactions minéralogiques

réactions entres phases pures ou solution solide de la forme

mu : muscovite

q : quartz

sill : sillimanite

ksp : feldspath K

liq : liquide

Comment est déterminée la position des réactions dans un espace P-T ?

1. approche expérimentale

Fig. 4.21. Diagramme de phases expérimental montrant la fusion de la péridotite KLB-1 en conditions anhydres (d'après Takahashi, 1986). Le solidus est figuré en trait épais. Les carrés pleins et vides correspondent aux points expérimentaux. La flèche représente une remontée adiabatique du manteau asthénosphérique. Comparer ce diagramme avec la grille pétrogénétique de la figure 4.20.

2. approche thermodynamique

Fig. 4.20. Section P-T montrant les relations chiméographes dans le système CMAS pour les phases anorthite, diopside, enstatite, forstérite, grenat, spinelle et liquide. Le solidus est figuré en trait épais. Les différents grisés marquent les champs de stabilité des péridotites à plagioclase, spinelle et grenat constituant le manteau lithosphérique.

1. approche expérimentale

principe : reproduire en laboratoire les conditions physico-chimiques de l'intérieur de la Terre

Fig. 4.2. Domaines P-T couverts par les principaux types d'appareillages expérimentaux. M/N = transition manteau-noyau, ZT = zone de transition, Moho = discontinuité de Mohorovicic. D'après Holloway et Wood (1988).

piston cylindre - Lab Magmas et Volcans

1. approche expérimentale

principe : reproduire en laboratoire les conditions physico-chimiques de l'intérieur de la Terre

Fig. 4.2. Domaines P-T couverts par les principaux types d'appareillages expérimentaux. M/N = transition manteau-noyau, ZT = zone de transition, Moho = discontinuité de Mohorovicic. D'après Holloway et Wood (1988).

enclume diamant (ENS Lyon)

Fig. 4.1. Diagramme P-T de MgSiO₃ déterminé expérimentalement. Les cercles noirs représentent le verre ou les produits de trempe, les cercles vides l'orthoénstatite non fondue et les carrés gris clair la clinoénstatite produite par inversion de la protoénstatite. D'après Boyd et England (1961).

2. approche thermodynamique

principe : - élaboration de **diagrammes de phases** en calculant les assemblages stables, connaissant leur propriétés thermodynamiques (S, V, H, Coeff. expansion thermique....), en fonction des variables P-T-X

outils :

- minimisation de l'énergie libre de Gibbs (G)

permet de déterminer les champs de stabilité des assemblages dans un espace P-T-X

- règles géométriques de Schreinemakers

permet de déterminer qualitativement l'agencement des équilibres dans l'espace P-T-X

- équation de Clapeyron et $\Delta G^{T,P}$ des réactions

permet de calculer la pente et la position des équilibres dans l'espace P-T-X

3. Outils de quantification des conditions P-T du métamorphisme

Quantification des paramètres physico-chimiques du métamorphisme

4 outils:

- **minéraux index**: approche qualitative et applicable au terrain
- **facies métamorphiques**: approche empirique et semi-quantitative et difficile à utiliser sur les roches non-basiques
- **diagramme de phases** (grilles pétrogénétiques, pseudo-sections): approche thermodynamique - outils fondamental et extrêmement puissant de modélisation directe des relations de phase
- **thermobarométrie**: approche thermodynamique et/ou empirique - outils fondamental de modélisation inverse

les minéraux index

- approche macroscopique utilisable sur le terrain basée sur l'apparition ou disparition de minéraux caractéristiques (notion d'isogrades)

isogrades

extrait carte de Rivesaltes
massif de l'Agly
BRGM 1/50000

mu -
sill +
and +
cord +
bio +

les facies métamorphiques

concept initialement introduit par Eskola en 1915 (puis largement révisé) qui a abouti à la sub-division de l'espace P-T en domaine dont chacun représente un faciès métamorphique

modifié d'après Winter (2001) et Spear (1993)

nomenclature : noms et l'extension P-T des facies a été défini sur la base des assemblages métamorphiques observés dans les metabasites (métabasalte)

limites de facies : position de réactions métamorphiques majeures dans les metabasites

Diagramme de phases

Grille pétrogénétique

Projection des équilibres univariants dans un espace P-T

Applicable quelque-soit la composition de la roche

Limité à des systèmes chimiques simples

Diagramme de phases

Pseudosection

Diagramme de phases montrant la stabilité des assemblages pour une composition de roche donnée

Équilibres multivariants

Al₂O₃ = 30.66, FeO=23.74, MgO=12.47, CaO=0.97, Na₂O=1.94, K₂O=9.83
(qtz en excès)

4. Un exemple de conditions anormales (perturbées) dans la croûte continentale

Gradient géothermique
stationnaire moyen

le massif de l'agly: un exemple de gradient métamorphique de BP

socle gneissique
+ granite intrusifs ~300 Ma

couverture allochtone
paleozoique
quartzo-pelitique
age metamorphisme : ~300Ma

exemple du massif de l'agly

paragenèse: chl + musc + q ± Fk

paragenèse: chl + musc + bio + q

paragenèse: crd + musc + bio + q

paragenèse: and + musc + bio + q +/- crd

paragenèse: sill + musc + bio + q +/- crd

paragenèse: FK + sill + bio + q
(musc – et liq +)

NCKFMASHTi

Na2O CaO K2O FeO MgO Al2O3 SiO2 TiO2

0,42 0,27 4,35 6,29 2,38 21,01 56,87 0,92

+ q + Pl

Autres exemples dans le Massif Central Français

- Occurrence locale d'éclogite (HP-HT)

- dôme du Lézou (Rouergue)
- Monts du Lyonnais - Pilat/Velay

- Pilat/Velay
- Agly

géotherme moyen

$$K = 2.25 \text{ W.m}^{-1}\text{.K}^{-1}$$

$$A = \text{mW.m}^{-3}$$

$$Q^* = 30 \text{ mW.m}^{-2}$$

$$D = 35\text{km}$$

exemple de métastabilité : graphite et diamant

Anderson, 2005

Figure 2.5 The mechanical analogy for carbon at Earth surface conditions. Graphite is the stable form of carbon because it has the lowest energy content of any form of carbon (under Earth surface conditions). Diamond has a higher energy content but is prevented from changing to graphite by an energy barrier.

- exemple des polymorphes de la silice

Figure 4-2. Phase diagram for the SiO₂ system showing the P-T stability fields for the silica polymorphs. From Zoltai and Stout (1984).

le fameux coesite → quartz

grt

Pourquoi les minéraux index (isogrades) ne sont pas de bons marqueurs des conditions PT ?

1. apparition d'une phase dépend de P, T et X (composition chimique du protolith)

2. apparition (ou disparition) d'une phase est liée à des réactions métamorphiques qui peuvent avoir lieu à différentes conditions P-T : exemple de la sill

Les bassins sédimentaires, archives des déformations lithosphériques

Cécile ROBIN

UN PEU D'HISTORIQUE

- **1858 : SORBY (formation d'une ride)**
- **1905 : Barrell (formation des deltas transféré dans l'ancien, en l'occurrence au Dévonien)**
- **1954 : Kuenen & Migliori, interprétation des granoclassements en termes de processus**
- **1962 : le premier modèle sédimentaire prédictif, la séquence de Bouma**
- **Fin des années 50's : la création de l'International Association of Sedimentologists**

LA SUITE DE L'HISTOIRE

- **Le contexte économique**
- **1977 La stratigraphie sismique (modèle de Vail)**
- **1988 La stratigraphie séquentielle (Posamentier et al, Homewood et al etc...)**

- **Mais en fait Haug en 1900 (relations géosynclinaux et variations du niveau de la mer)**

- **Et surtout Walter dès 1880 ...**

AVÈNEMENT DE LA STRATIGRAPHIE SEQUENTIELLE

LE FACTEUR TECTONIQUE

VITESSE DE SUBSIDENCE : **30-100 m/Ma** (maximum 150 m/Ma)

DUREE : **100-200 Ma**

ACCUMULATION MOYENNE : **3-5 km**

(F. Guillocheau, inédit)

LE FACTEUR TECTONIQUE

RELATIONS TECTONIQUE - SEDIMENTATION

LE FACTEUR TECTONIQUE : LES SUBSIDENCES

Subsidence tectonique

Subsidence thermique

Subsidence gravitaire Ou Isostasie

LE FACTEUR TECTONIQUE : LES SUBSIDENCES

Subsidence tectonique

Subsidence thermique

Subsidence gravitaire Ou Isostasie

(Nalpas, inédit)

UN ou DES NIVEAUX MARINS ?

(Homewood et al., 1999)

LA NOTION D'ACCOMODATION

LA NOTION D'ACCOMODATION

accommodation

éléments architecturaux

$\frac{a/s}{\text{accommodation}} / \text{sedimentation}$

architecture stratigraphique

représentation

$a/s > 1$
rétrogradation

$a/s = 1$
aggradation

$0 < a/s < 1$
progradation

$a/s = 0$
progradation

$a/s < 1$
progradation

● ● ● Maximum Flooding Surface
MFS

■ ■ ■ Flooding Surface
FS

LA SEQUENCE DE DEPÔT

1 VARIATION
DU NIVEAU RELATIF
DE LA MER

1 SEQUENCE DE DEPOTS

VALABLE QUELQUE SOIT LA DUREE DE LA VARIATION DU NIVEAU RELATIF DE LA MER
(de quelques dizaines de milliers d'années à la dizaine de millions d'années)

COMMENT DISCRIMINER LES FACTEURS DE CONTRÔLE ?

(Guillocheau, 1995)

DISCRIMINATION DES FACTEURS DE CONTRÔLE : MESURE DE L'ACCOMODATION

Eustatisme = f (temps)
Tectonique = f (temps, espace)

BASSIN DE PARIS (Robin et al., 1998, *Terra Nova*)

DISCRIMINATION DES FACTEURS DE CONTRÔLE : MESURE DE L'ACCOMODATION

EXTRACTION DU SIGNAL EUSTATIQUE

EXTRACTION DU SIGNAL TECTONIQUE

BASSIN DE PARIS (Robin et al., 1998, Terra Nova)

EXEMPLE DU BASSIN DE PARIS

EXEMPLE DU BASSIN DE PARIS

EXEMPLE DU BASSIN DE PARIS

Profondeur du Moho

EXEMPLE DU BASSIN DE PARIS

(Masclé)

EXEMPLE DU BASSIN DE PARIS

EXEMPLE DU BASSIN DE PARIS

Gravimétrie bu Bassin de Paris
(correction de Bouguer, Debeglia, 2000)

Extension permienne : collapse gravitaire post-hercynien

Carte des Bassins permien (Masclé, 1990)

(Thèse Le Solleuz, 2003)

EXEMPLE DU BASSIN DE PARIS

➤ **Topographie de 3000-3500 m à Paris, il y a 300 Ma**

➤ **Géométrie type « cordillère »: flanc court/flanc long**

➤ **Ennoiement à l'Est puis migration vers l'Ouest**

EXEMPLE DU BASSIN DE PARIS

EXEMPLE DU BASSIN DE PARIS

Odr, 1994

LE RENOUVEAU DES MARGES PASSIVES

(Séranne, 1979; Guennoc et al. 1994)

RELATIONS TECTONIQUE - SEDIMENTATION

WEST

EAST

(Castelltort et al., 2003)

RELATIONS TECTONIQUE - SEDIMENTATION

RELATIONS TECTONIQUE - SEDIMENTATION

subsidence ↓ **depositional profil**

subsidence ↓ **sedimentary thickness**

subsidence ↓ **stratigraphic sequences**

(Robin et al., 2005)

RELATIONS TECTONIQUE - SEDIMENTATION

a/s
accommodation
sedimentation

$a/s > 1$
rétrogradation

$a/s = 1$
aggradation

$0 < a/s < 1$
progradation

$a/s = 0$
progradation

$a/s < 1$
progradation

BASSIN COMPRESSIF
BASSIN D'AVANT-PAYS

20 - 40 Ma

BASSIN EXTENSIFS

RIFT

5 - 20 Ma

MARGE PASSIVE

100 - 200 Ma

RELATIONS TECTONIQUE - SEDIMENTATION

Un processus de déformation est caractérisé par :

- Une amplitude de mouvement,
- Une durée caractéristique
- Une longueur d'onde

RELATIONS TECTONIQUE - SEDIMENTATION

LE SIGNAL EUSTATIQUE

↓ Troisième niveau marin

(Homewood et al., 1999)

↓ Tectono - eustatisme

↓ Glacio- ou climato - eustatisme

PRECESSION : 21 000 ans

OBLIQUITÉ : 40 000 ans

EXCENTRICITÉ DE L'ORBITE : $\approx$ 100 000 ans

LE SIGNAL EUSTATIQUE

(Homewood et al., 1999)

LES FACTEURS DE CONTRÔLE

CHARTE BIOCHRONOSTRATIGRAPHIQUE

Hardenbol et al. (1998)

CHARTES EUSTATIQUES

Hallam (1988) Hardenbol et al. (1998)

(Haq et al., 1987)

LES FACTEURS DE CONTRÔLE

- **Vitesse de croissance des rides?**
- **Age moyen des fonds océaniques?**

LES FACTEURS DE CONTRÔLE

(Duval et al., 1997)

LE CYCLE DE WILSON

HAQ's SEA LEVEL CURVE

93 Ma
Amplitude
+270 m

(Haq *et al.*, 1987)

LE SIGNAL EUSTATIQUE

CORRELATION between Mean Age of Oceanic Lithosphere and Long term eustatic sea level

$h=f(t)$ following: — Stein & Stein (1992)
— Humler et al. (1999)

J.P. Cogné, E. Humler and V. Courtillot.
 Mean age of oceanic lithosphere drives eustatic sea-level change since Pangea breakup. *Earth Planet. Sci. Lett.*, 245, 115-122, 2006.

LE SIGNAL EUSTATIQUE

EFFECT OF MANTLE PROCESSES: DYNAMIC TOPOGRAPHY ?

Deformation of solid earth +/- 1 500 m (Lithgow-Bertelloni & Gurnis, 1993)

+/- 3 000 m (Ricard *et al.*, 1993)

Duration

x10 Ma

Possible eustatic effect

+/- 80 m (Husson & Conrad, 2006)

1m/Ma (Conrad & Husson, 2009)

- ✓ Local variations $\lambda > 1000$ km
- ✓ World ocean volume variations

LE SIGNAL EUSTATIQUE

ALBIAN – CENOMANIAN : 100 Ma

SHORELINES: — Albian → TRANSGRESSION
 — Cenomanian → REGRESSION

CENOMANIAN – TURONIAN: 94 Ma

SHORELINES: — Cenomanian — Turonian

→ TRANSGRESSION
→ REGRESSION

SIGNAL EUSTATIQUE & TOPOGRAPHIE DYNAMIQUE

AMPLITUDE VARIATIONS OF THE DYNAMIC TOPOGRAPHY VERTICAL MOVEMENTS

(based on Müller *et al.*, 2008, using model predictions at 100 and 90 Ma)

Cenomanian - Turonian (94 Ma)

RELATIVE SEA LEVEL RISE

RELATIVE SEA LEVEL FALL

SIGNAL EUSTATIQUE & TOPOGRAPHIE DYNAMIQUE

ALBIAN – CENOMANIAN: 100 Ma

✓ **MAXIMUM FLOODING:**
Turonian (94-92 Ma)

CENOMANIAN – TURONIAN: 94 Ma

✓ **NO WORLD-SCALE
TRANSGRESSION**

Processes ?

LE SEUL SIGNAL EUSTATIQUE GLOBAL : LE CLIMATO-EUSTATISME ?

Sea water temperature variations since 200 Ma: a proxy of climato-eustasy?

LE RELIEF DE LA TERRE

CREATION DE RELIEFS :

- Les domaines extensifs
- Les domaines compressifs
- Le volcanisme

LE RELIEF DE LA TERRE

↓ QUELLE HYPOMETRIE POUR L'ANCIEN

LA DISTRIBUTION ACTUELLE DES ALTITUDES CONTINENTALES
EST - ELLE SIMILAIRE A CELLE DU JURASSIQUE TERMINAL / BASE CRETACE?

OXFORDIEN BASAL :

(Enay & Mangold 1980)

ACTUEL :

LE RELIEF DE LA TERRE

LE RELIEF DE LA TERRE

LE RELIEF DE LA TERRE

LE RELIEF DE LA TERRE

LE RELIEF DE LA TERRE AU CENOMANIEN

95-90 My

Paleoelevation

0 1.5-2 km

Continental subsiding area

Shallow marine subsiding area

LES FLUX SEDIMENTAIRES

(Bourquin, 2004)

LES SEDIMENTS ENREGISTREURS DU CLIMAT

**BASSIN DE MURZUQ (Libye)
ORDOVICIEN TERMINAL**

LES SEDIMENTS ENREGISTREURS DU CLIMAT

**BASSIN DE PARANA (Brésil)
PERMO-CARBONIFERE
(photo : Max DEYNOUX)**

LES SEDIMENTS ENREGISTREURS DU CLIMAT

LES SEDIMENTS ENREGISTREURS DU CLIMAT

LES SEDIMENTS ENREGISTREURS DU CLIMAT

LES SEDIMENTS ENREGISTREURS DU CLIMAT

(Zachos et al., 2001)

LES SEDIMENTS ENREGISTREURS DU CLIMAT

LES SEDIMENTS ENREGISTREURS DU CLIMAT

GRADIENT CLIMATIQUE
POLE-EQUATEUR
AU COURS DU PHANEROZOIQUE

(Odin, UNESCO, 2000)

(modifié d'après BOUCOT & GRAY, 2001)

Contrôle géodynamique : le cycle de Wilson

- **Position des continents**
- **Altitude moyenne des continents**
- **Bilan d'altération des continents**
- **Circulation océanique**

Contrôle astronomique : les cycles de Milankovitch

Cycle du Carbone

- **Altération des silicates**
- **Volcanisme**
- **Végétation**

LES SEDIMENTS ENREGISTREURS DU CLIMAT

La Snow - Ball

730 Ma Sturtienne

650-630 Ma Marinoenne

Contexte panafricain

Tectonique Varangienne

Masse continentale à l'équateur?

Ordovicienne : l'Hirlantienne

durée 1 Ma?

les faciès du Sahara

La Famenien - Turnesienne

Masse continentale au pôle Sud

Post chaîne eo-varisque

Post apparition des plantes vasculaires

La Permo-Carbonifère

Masse continentale au pôle et fortes altitudes

Chaîne Hercynienne

Post carbonifère : végétation

A l'Oligocène (24 Ma)

Masse continentale au pôle

Post chaîne eo-varisque

Plio-Pleistocène

Masse continentale aux 2 pôles

Point chaud sous le pôle sud

Rift du Groenland

LES ARCHIVES SEDIMENTAIRES

A photograph of a desert landscape featuring layered rock formations and a central canyon. The text "MERCİ DE VOTRE ATTENTION" is overlaid in the center.

MERCİ DE VOTRE ATTENTION

REPENSER LES CARTES PALEOGEOGRAPHIQUES

BARREMIAN (130-125 Ma)

RIVER PALEO-FLOWS

LAKE BASELEVEL

LAKE

EROSION

EROSION

EROSION

MAGMATISM

PALEO-DIVIDES

REPENSER LES CARTES PALEOGEOGRAPHIQUES

59-56 Ma

REPENSER LES CARTES PALEOGEOGRAPHIQUES

THE APTIAN EVAPORITES OF THE CENTRAL SEGMENT OF THE SOUTH ATLANTIC : GEODYNAMICS CONTEXT AND CLIMATIC IMPLICATIONS

Thèse A. C. CHABOUREAU

- Craton
- Cretaceous volcanism
- SDRs and related volcanism
- Aptian salt
- Fracture Zone

REPENSER LES CARTES PALEOGEOGRAPHIQUES

**Syn-rift.
Intra AS3**

**Proposed age :
Berriasian –
Valanginin
boundary
(141 – 139 Myr)**

LAKE

- Deep lake to the North
- Hiatus to the South (except in the Namibe basin)

- Localised rift activity in the North
- Rift activity in Namibe

REPENSER LES CARTES PALEOGEOGRAPHIQUES

Syn-rift.
Intra AS5

Proposed age :
**Intra
Valanginian**
(137 – 136 Myr)

LAC

- extension of the deep lake in the North.
- Hiatus to the South
- Volcanism in the South

- Paroxysm of the tift activity to the North
- Rift activity in Namibe

REPENSER LES CARTES PALEOGEOGRAPHIQUES

**Syn-rift.
Intra AS6**

**Proposed age :
Hauterivian
Barrémian
boundary
(131 – 129 Myr)**

- Deep lake in the North.
- Widespread volcanism to the South

- Rift activity in the North.

REPENSER LES CARTES PALEOGEOGRAPHIQUES

Syn-rift.
AS8

Proposed age :
Upper
Barremian
(128 – 126 Myr)

LAKE

- Expansion of the lake.
- Shallow anoxic lake in the North

- Spreading of the rift activity to the South.
- quiet tectonic activity to the North
- Paroxysm to the rift activity to the South

REPENSER LES CARTES PALEOGEOGRAPHIQUES

Syn-rift. AS10

Proposed age : Lower Aptian (124 – 123 Myr)

- Widespread carbonated lake
- First marine flooding
- Flattening of the rift shoulders

- Rift activity in transition to the SAG phase.

REPENSER LES CARTES PALEOGEOGRAPHIQUES

Syn-rift.
AS11

Proposed age :
Lower Aptian
(123 – 121 Myr)

HIATUS

- Widespread hiatus
- Carbonated lake in the southern part

- Rift activity in transition to the SAG phase.

REPENSER LES CARTES PALEOGEOGRAPHIQUES

SAG
Intra AP3

Proposed age :
Middle Aptien ?
(119 – 116 Myr)

Episodic marine incursions

Alluvial

- More alluvial sedimentation
- Carbonated lake in the South
- Flattening of the rift shoulders
- Marine incursions.

• SAG PHASE

REPENSER LES CARTES PALEOGEOGRAPHIQUES

Incursions marines

SAG
Intra AP4

Proposed age :
Middle-Upper
Aptien?
(116 – 114 Myr)

• Salt

• SAG

INTERPRETATION : DYNAMIC TOPOGRAPHY

LITHOSPHERE AGE VARIATION

110-100 Ma *Albian – Cenomanian (100 Ma)*

100-90 Ma *Cenomanian - Turonian (94 Ma)*

INTERPRETATION : DYNAMIC TOPOGRAPHY

Model based on present-day tomography

(Müller *et al.*, 2008)

Model based on the past location of the subductions

(Flament *et al.*)

INTERPRETATION : DYNAMIC TOPOGRAPHY

AMPLITUDE VARIATIONS OF THE DYNAMIC TOPOGRAPHY VERTICAL MOVEMENTS
(based on Müller *et al.*, 2008, using model predictions at 100 and 90 Ma)

Cenomanian - Turonian (94 Ma)

RELATIVE SEA LEVEL RISE

RELATIVE SEA LEVEL FALL

INTERPRETATION : MANTLE GLOBAL WARMING BELOW A SUPERCONTINENT

TEMPERATURE FIELD

Supercontinent

Two antipodal continents

→ Uplift

(Coltice *et al.*, 2007)

LES SEDIMENTS ENREGISTREURS DU CLIMAT

ALTERATION CHIMIQUE INTENSE
Kaolinite, gibbsite, oxydes et hydroxydes
d'aluminium

ALTERATION CHIMIQUE INTENSE
Kaolinite, oxydes et hydroxydes de fer

ALTERATION CHIMIQUE MODEREE
Illite, smectite

REGIONS ARIDES
Faible taux d'altération chimique

REGIONS A BASSE TEMPERATURE
Altération chimique faible

REGIONS RECOUVERTES PAR LA GLACE
Pas d'altération

REGIONS DE MONTAGNES
Altération très variable - érosion dominante

LES SEDIMENTS ENREGISTREURS DU CLIMAT

(Busson, 1983)

***L'évolution du concept d'isostasie et
son rôle dans la perception de la résistance
de la croûte et du manteau***

Siegfried LALLEMANT
*Département Géosciences-Environnement
Université de Cergy-Pontoise*

***Colloque AFPSVT - Mardi 14 janvier 2014
LA CROÛTE CONTINENTALE***

Bibliographie (*aspects historiques*)

DEPARIS V. et LEGROS H., Voyage à l'intérieur de la Terre, 2000 (CNRS éd.)

GOHAU G., Histoire de la Tectonique, 2010, (Vuibert)

Institut culturel de Bretagne, Pierre Bouguer, un savant breton au XVIIIe siècle, 1998

ORESQUES N., The rejection of Continental drift, 1999, (Oxford Univ. Press)

WATTS A., Isostasy and Flexure of the lithosphere, 2001, (Cambridge Univ. Press)

Plan

- I) Aux origines du concept: le problème de Bouguer**
- II) Les théories de l'isostasie**
- III) L'isostasie à l'heure de la tectonique des plaques**
- IV) Une controverse moderne : « Jelly sandwich » ou « crème brûlée » ?**

A l'origine, un problème géodésique *et une controverse franco-anglaise*

Fig. 5a

Fig. 5b

Jean-Dominique Cassini

La Terre selon Newton
Forme déduite de la mécanique
du corps en rotation

La Terre selon Cassini
forme déduite des triangulations
en France métropolitaine

Les expéditions Laponie-Equateur (suite)

- La campagne « **équatoriale** » débute en 1735 au **Pérou**, dirigée par **La Condamine** (chimiste et géographe) avec **Godin** (astronome) **Bouguer** (mathématicien et physicien) et **Jussieu** (naturaliste). Elle ne se terminera qu'en 1743 !
- La campagne « **polaire** » débute en 1736 en **Laponie** sous la direction de **Maupertuis**, accompagné du mathématicien **Alexis Clairaut** et du physicien suédois **Anders Celsius** ainsi que de **Camus** et **Lemonnier**. Elle se termine en 1737 et *Maupertuis aura donc la primeur du résultat :*

La Terre est bien aplatie aux pôles !!!!

Pierre Louis Moreau de Maupertuis

et l'expédition de Laponie (1736-1737)

- L'expédition de Maupertuis en Laponie (Suède actuelle) est moins lointaine et plus facile (de bonnes cartes existent) que celle du Pérou. Son équipe achève rapidement la mesure d'un degré d'arc de méridien entre Kittis et Tornea qui confirme la théorie de Newton avec une valeur de ce degré de méridien proche du pôle nord supérieure à celle d'un degré de méridien près de Paris]. Dès lors, « ce résultat, habilement mis en scène par Maupertuis, tant à l'Académie des sciences que dans les salons parisiens et dans ses publications, engendre en quelques années la déconfiture du parti cartésien »]. Maupertuis en est auréolé de gloire. Il devient membre de la quasi-totalité des sociétés scientifiques d'Europe.

Voltaire lui rend, en vers, un vibrant hommage :

*Héros de la physique, Argonautes nouveaux
Qui franchissez les monts, qui traversez les eaux
Dont le travail immense et l'exacte mesure
De la Terre étonnée ont fixé la figure.
Dévoilez ces ressorts, qui font la pesanteur.
Vous connaissez les lois qu'établit son auteur.*

Le compliment de Voltaire peut se faire plus ambigu:

*Vous avez confirmé en ces lieux plein d'ennui
Ce que Newton connut sans sortir de chez lui*

Maupertuis 1698-1759

Charles Marie de La Condamine,

et l'expédition du Pérou (1735-1743)

- **L'expédition de La Condamine à l'Equateur est beaucoup plus ambitieuse** (mesure de 3° d'arc soit à peu près 350 km), **plus complexe et « aventureuse » dans des territoires montagneux et mal cartographiés** au préalable. Ce qui explique sa durée. Elle sera marquée par le décès de trois membres, les dissensions entre les participants restant (*Godin dilapidera une grande partie de l'argent de la mission*) qui se sépareront en 1742 (*des coureurs à pied transmettaient les mesures de l'un à l'autre*) et rentreront séparément en Europe. La Condamine explorera l'Amazonie pendant son retour et ne rentrera qu'en 1744 avec une estimation légèrement différente de celle de Bouguer mais qui les opposera durablement.

La Condamine
(1701–1774)

BOUGUER Pierre (1698-1758)

**Mathématicien – physicien – géodésien –
architecte naval nommé membre honoraire de
l'académie de marine en 1752**

Elu associé géomètre de l'Académie royale des sciences en 1731 – pensionnaire astronome en 1735 – directeur en 1748 et 1755

« Né au Croisic où il dirigea l'école d'Hydrographie (dès l'âge de 16 ans !), il attira en 1729 l'attention de l'Académie des sciences par des mémoires scientifiques dont un *Traité de la mâture des vaisseaux*. Il fut désigné pour participer à l'expédition qui partait en 1735 pour mesurer au Pérou la longueur d'un degré de latitude équatoriale, **élément de la résolution de la controverse sur l'aplatissement de la Terre**. Dans le cadre des réflexions sur la résolution de la longitude, il inventa un micromètre ou *héliomètre* destiné à la mesure des diamètres de la Lune et du Soleil. Parmi ses nombreux ouvrages, le novateur voire révolutionnaire *Traité du navire* dans lequel il introduisait le métacentre dans l'appréciation de la stabilité des navires, *De la méthode d'observer exactement sur mer la hauteur des astres*, le *Traité de la manœuvre des vaisseaux*, et le *Nouveau Traité de navigation et de Pilotage* en font l'une des figures majeures de la marine savante. Ils justifiaient sa nomination parmi les dix premiers membres honoraires de l'Académie de marine. »
Texte de L. Ferreiro tiré de « Pierre Bouguer, un savant breton au XVIIIe siècle »

Pierre Bouguer
Portrait au pastel par
Jean-Baptiste Perronneau en 1753
Musée du Louvre. Photo RMN

BOUGUER Pierre (1698-1758)

« ... Il alla ensuite au Collège des Jésuites de Vannes où il excella tant en mathématiques qu'à l'âge de onze ans, le Directeur de l'école lui demanda d'enseigner les mathématiques, ce qu'il fit.

Deux ans plus tard, ayant critiqué une proposition présentée par son professeur de mathématiques, celui-ci, offensé, défia Bouguer, alors âgé de treize ans, dans un débat public. Bouguer l'emporta haut la main sur son adversaire et le réduisit au silence ce qui entraîna le départ du professeur, couvert de honte.

Cet enfant prodige, si exceptionnellement doué, fit à nouveau ses preuves deux ans plus tard, quand la mort de son père laissa vacant le poste d'hydrographe qu'il tenait. Le jeune Bouguer posa sa candidature pour le poste et, après des hésitations initiales des autorités, il réussit l'examen rigoureux auquel il fut soumis et, en 1713, il reçut le poste de professeur d'hydrographie au Croisic. Pierre Bouguer avait juste quinze ans.

La vie de Bouguer semblait toute tracée au Croisic. Pendant presque vingt ans, il allait s'adonner à l'enseignement et à la recherche. Il tourna alors son attention sur la navigation et reçut en 1729 le prix pour la meilleure façon d'observer les étoiles en mer, puis le prix de 1731 concernant le problème de la variation des compas en mer.

Entre temps, Bouguer avait aussi étudié l'optique et publié en 1729 un essai sur ce sujet qui, une fois de plus, attira sur lui l'attention de l'Académie des Sciences (et qui, en fait, préparait la voie de la photométrie). En 1730, Bouguer quitta Le Croisic pour Le Havre où il prit le poste d'Hydrographe Royal. Le 5 septembre 1731, l'Académie des Sciences lui donna le titre de Géométricien Associé. Bouguer avait alors trente-trois ans. »

Texte de L. Ferreiro tiré de « Pierre Bouguer, un savant breton au XVIIIe siècle »

Pierre Bouguer
Portrait au pastel par
Jean-Baptiste Perronneau en 1753
Musée du Louvre. Photo RMN

Forme de la Terre et mesure du méridien

Mesures de distances + Mesure astronomique et triangulation des latitudes

Etoile polaire

Fig. 1.1 The determination of the astronomical latitude, ϕ , from observations of the pole star.

La méridienne de Cassini
Partie de Dunkerque à Paris

Le problème soulevé par Bouguer

- La qualité de la méthode de triangulation dépend de :
 - 1) la qualité de la mesure de distance de la ligne de base
 - 2) la précision de mesure des angles
 - **3) la précision de l'appréciation de la verticale**

Pierre Bouguer est un physicien très soucieux de précision de la mesure. Imprégné des théories de Newton, **il s'étonne que les mesures obtenues à l'Equateur soient aussi cohérentes alors que les masses montagneuses imposantes auraient du modifier localement l'attraction terrestre et donc dévier significativement le fil à plomb.**

Fig. 10

Bouguer et la méthode expérimentale

« au sommet du monde »

Pour tester l'effet des reliefs sur la verticalité,

Bouguer choisit un exemple « simple » :

le volcan Chimborazo

le volcan Chimborazo

(situé en Équateur à environ 180 km au sud de Quito, il culmine à 6268 m d'altitude et sa base faisant 20 km de diamètre. En tenant compte de la forme générale de l'ellipsoïde, c'est le point le plus éloigné du centre de la Terre et donc Le point le plus haut du monde !!, détrônant ainsi l'Everest).

Bouguer et la « méthode expérimentale »

Pour « mesurer » la déviation de la verticale autour d'une masse simple (le volcan), Bouguer mesure la distance zénithale d'une même étoile de part et d'autre du volcan. Il calcule la différence angulaire, la corrige de la courbure de la Terre et obtient une valeur de $7''$ qu'il compare à la valeur $1' 43''$ prédite par l'attraction du volcan supposé de densité uniforme.

Il en déduit que l'attraction exercée par la montagne est beaucoup plus faible que ce qu'on attendrait de la masse de matière qu'elle représente !!!

Boscovich et la « compensation »

- Bouguer est suivi dans cette voie par R.G. Boscovich (ou Boscovic, *mathématicien d'origine croate*) en **1755** qui écrit:
- « Je pense que les montagnes sont dues principalement à l'expansion thermique de matériaux en profondeur là où les roches de surface sont soulevées. Le soulèvement ne signifie pas un flux ou un ajout de matière en profondeur, **le vide à l'intérieur de la montagne « compensant » les masses au dessus.** »

Le terme de compensation est « né »

John Frederik William Herschel

astronome (1792-1871)

et la croûte flottant sur un océan de lave

- Fils de l'astronome célèbre W. Herschel (découvreur d'Uranus) et admirateur du grand géologue anglais **Lyell**, **J. Herschel** propose dans une lettre adressée à ce dernier en 1836 que la couche la plus externe de la Terre ou **croûte soit en équilibre dynamique sur son substratum : un océan de lave**. Selon ses vues, **si la croûte supporte une charge comme des sédiments, elle s'enfonce chassant latéralement la lave sous-jacente**.
- **C'est ce type de représentation qui sera à la base de l'isostasie au sens d'Airy mais aussi de la vision des continents « flottant » de Wegener**

Charles Babbage (1790-1871)

- Mathématiciens plus connu comme le père des machines à calcul et donc des ordinateurs, Babbage est également ami avec Lyell et inclut la lettre de Hershel (*qui serait peut être restée inconnue sinon*) dans son traité de 1847 sur les beautés de la Création.

Charles Babbage (1790-1871)

Il y décrit aussi ses observations sur le « temple de Serapis » (200 av. J.C.) à Pozzuoli (Italie) où il observe en 1828 sur trois colonnes des encroûtements noirs à 4 mètres au dessus de leur base avec des perforations dues à des lithophages marins (*modiola lithophaga*). **Il en déduit une séquence de subsidence et de soulèvement entre la construction et l'observation** qu'il relie à l'expansion thermique liée au volcan actif.

Le « temple de Serapis », Pozzuoli

[http://en.wikipedia.org/wiki/File:Serapeum_\(Pozzuoli\)_-2.jpg](http://en.wikipedia.org/wiki/File:Serapeum_(Pozzuoli)_-2.jpg)

Le « temple de Serapis », Pozzuoli

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pozzuoli_2010-by-RaBoe-15.jpg

Charles Lyell (1797-1871)

et le « temple de Serapis »

- A noter que le grand Géologue anglais **Charles Lyell à qui on doit le principe de l'uniformitarisme ou actualisme** exposé en 1830 dans son oeuvre majeure : “Principles of Geology: Being an Attempt to Explain the Former Changes of the Earth's Surface by Reference to Causes now in Operation” (ou **“Principes de la Géologie : une tentative d'explication des changements anciens de la surface de la Terre en rapport avec les causes actuelles”**) **a choisi l'image du temple de Serapis comme frontispice de son livre et l'utilise comme exemple type d'application de l'actualisme !!!!**

Charles Lyell et le « temple de Serapis »

Temple de Serapis à Héliopolis

PRINCIPLES

OF
GEOLOGY.

AN ATTEMPT TO EXPLAIN THE FORMER CHANGES
OF THE EARTH'S SURFACE,

BY REFERENCE TO CAUSES NOW IN OPERATION.

BY
CHARLES LYELL, Esq., F.R.S.

FOR. SEC. OF THE GEOL. SOC., &c.

IN TWO VOLUMES.

Vol. I.

LONDON:
JOHN MURRAY, ALBEMARLE-STREET.

MDCCCXXXII.

Sir G. Everest (1790-1866), *Surveyor-General of India*

En charge des levés géodésiques de l'Inde,
Everest part du principe que l'ellipsoïde terrestre est bien connu.

Il peut donc comparer les mesures astronomiques (visée des étoiles) obtenues soit par rapport au fil à plomb (position «astronomique») soit par rapport à la perpendiculaire à l'ellipsoïde connu (position «géodésique»).

La différence de latitudes « géodésiques » pour deux stations situées au pied de l'Himalaya (Kaliana et Kalianpur) est 5,24'' plus petite que la différence des latitudes astronomiques.

Mais Everest qui a confiance en ses déterminations « astronomiques » met en cause la précision des triangulations « géodésiques »

John Henry Pratt (1809-1871)

- Pratt, archidiacre de Calcutta mais aussi mathématicien formé à Cambridge, s'intéresse au problème initialement posé par Bouguer et réactualisé par Everest et, en désaccord avec ce dernier, pense que la différence est due à un effet perturbateur des masses de l'Himalaya voisin.
- Dans un article de 75 pages (!!) où il développe ses calculs à partir de la gravité de Newton, Pratt évalue la contribution de l'Himalaya sur les stations Kaliana et Kalianpur (malgré une connaissance très limitée de la topographie réelle de l'Himalaya !) et **déduit que la montagne peut engendrer une déviation de la verticale de l'ordre de 15,885''** mais **sa conclusion est qu'il n'explique pas la différence observée et que le problème doit être étudié plus en détail.**

George Biddell AIRY (1801-1892)

Peu après la parution de l'article de Pratt, G. Airy, professeur d'astronomie à Cambridge propose en 1855 dans un article à la «Royal Society » une autre interprétation.

Intimement persuadé que **la croûte est mince et flotte sur une couche de lave plus dense qu'elle**, Airy utilise l'analogie de l'Iceberg pour suggérer que les domaines d'altitude importante (grands plateaux) sont situés au dessus de domaines profonds où de la croûte légère se substitue à la lave dense.

C'est une hypothèse qu'Airy développe en seulement 3 pages et sans grands développements mathématiques et où il dit que contrairement à Pratt, il n'y a pas lieu de s'étonner des différences observées par Everest !!!

Comme son hypothèse implique des fractures au bord de la zone qui s'enfonce, **Il reconnaît que son modèle pourrait ne pas s'appliquer là où la croûte est trop « résistante ».**

Fig. 1.14. Airy's hypothesis of a crust that "floats" upon "lava". Reproduced from Fig. 2 of Airy (1855) with permission of the Royal Society.

Isostasie au sens d'Airy (la plus classique !)

$$\delta_1 = 5.240'', \delta_2 = 15.885''$$

Fig. 1.12. The deflection of the vertical at Kaliana, northern India. δ_1 is the deflection determined by Everest from astronomic and geodetic observations. δ_2 is the deflection calculated by Pratt due to the mass excess of the Himalaya, Tibet and Kun Lun above sea-level. The shading schematically shows the mass deficiency that was inferred by Airy and, later, Pratt to underlie the mass excess.

« encore » John Henry Pratt (1809-1871)

- **En 1858, Pratt suit les suggestions d'Airy sur la présence de déficits de masse compensant les excès de surface mais en présentant un nouveau modèle dans lequel les reliefs sont le résultat de variations de densité d'une croûte épaisse et rigide en fonction de son état thermique**

Il critique l'approche d'Airy sur 3 points :

- **1) Airy suppose une croûte mince**
- **2) Il suppose que la croûte est moins dense que la lave sous-jacente**
- **3) Le modèle d'Airy n'est pas en accord avec la théorie de la contraction de la Terre qui est dominante à cette époque.**

La vision de l'isostasie selon Pratt

- **Wegener résumera ainsi la présentation de Pratt : « Pratt se figurait l'écorce terrestre comme une pâte primitivement d'épaisseur uniforme, qui en levant, en quelque sorte, s'est gonflée en certains endroits donnant naissance aux continents, les parties comprimées formant les zones océaniques. »**

La genèse des continents et des océans, 1929, 4e éd.

L'isostasie au sens de Pratt

Fig. 1.15. Pratt's hypothesis that mountains are underlain by low-density regions while oceans are underlain by high-density regions. At some depth, known as the "level surface", masses are equal.

Cette controverse Pratt – Airy de 1855 n'intéressera pas la communauté scientifique avant 1881 lorsque le révérend O. Fisher reprendra l'hypothèse de Airy et surtout 1889 avec Dutton !

Clarence DUTTON (1841-1912)

- Bien que les concepts existent depuis 1855, c'est C. Dutton, géologue américain, qui est l'inventeur du terme **d'isostasie** en **1889**,
- Le terme est dérivé du grec, de iso (égal) et statikos (stable) ou « même équilibre stable partout ».
- Dutton note qu'il aurait préféré utiliser le terme « isobarie » (égale pression), qui était déjà utilisé dans un autre contexte.
- De fait, l'équilibre isostatique signifie qu'il existe une profondeur nommée surface de compensation au niveau de laquelle les pressions exercées par les colonnes sus-jacentes sont égales quelle que soit la topographie et/ou les variations de densité

Les théories de l'isostasie au début du XXe siècle

John Fillmore Hayford
(1868 – 1925)

Veikko Heiskanen
(1895 – 1971)

A l'instar de J.F. Hayford, la communauté scientifique américaine adoptera le modèle de Pratt qu'il quantifie et transforme en méthode de correction pratique des levés géodésiques.

En Europe au contraire, on sera plus réceptif au modèle d'Airy que quantifiera V. Heiskanen en Suède dès 1924 en l'utilisant comme méthode de correction géodésique qui sera largement adoptée dans toute l'Europe et. A. Wegener en tirera profit dans son interprétation des océans et des continents.

Les deux modèles dans leur présentation « moderne » du XXe siècle

Fig. 1.18 The Airy-Heiskanen model of isostatic compensation.

Même densité et épaisseur de croûte variable

Densités variables reflétées par les altitudes

Isostasie et relief au sens d'Airy-Heiskanen

Pour une colonne homogène, la pression s'écrit

$$P = F/S$$

ou

$$P = mg/S$$

$$P = \rho Vg/S$$

soit

$$P = \rho gh$$

Pour une série de colonnes

$$P = \Sigma(\rho gh)$$

$$h_c \rho_c + H \rho_m = h \rho_c + h_c \rho_c + H \rho_c$$

$$h \rho_c = H (\rho_m - \rho_c)$$

Une confirmation partielle par la sismique réfraction

Fig. 1.32. Seismic refraction profile of the crust and upper mantle structure from Hawaii in the west, across the mainland United States, to France. The profile shows striking evidence for the Airy-Heiskanen hypothesis with mountains underlain by thick crust and oceans underlain by thin crust. Reproduced from Fig. 7-5 of Heiskanen and Vening-Meinesz (1958).

D'après Heiskanen et Vening-Meinesz, 1958

L'illustration par Bowie (1927) des hypothèses d'isostasie de Pratt (a) et Airy (b) utilisant des blocs de métal représentant le SIAL flottant sur du mercure fluide mais de masse volumique plus élevée représentant le SIMA de Suess

Niveaux de compensation gravimétrique et mécanique sont confondus !!!!!

Dans notre vision moderne, c'est la limite de l'analogie avec les Icebergs

Wegener et l'isostasie

Fig. 8. — Les deux maxima de fréquence altitudinaire.

Fig. 9. — Coupe schématique d'un bord continental. Traits interrompus horizontaux = Eau.

Wegener et l'isostasie

« Si les socles continentaux flottent réellement dans un fluide, fût-il même très visqueux, il n'y a aucun motif d'admettre qu'ils ne puissent se mouvoir que verticalement, les mouvements horizontaux étant exclus. »

Fig. 11. — Soulèvement actuel de la région baltique compte tenu des nivellements (cm/année), d'après WITTING.

« Ceux-ci sont d'autant plus probables qu'il existe des forces qui s'exercent pendant des durées comparables à celles des périodes géologiques et qui tendent à les faire se déplacer horizontalement, comme le montrent les transports en masse des plis terrestres. »

Joseph BARRELL (1869-1919)

Lithosphère – Asthénosphère : les notions existaient en ... 1914

- La notion et les termes remontent à Joseph Barrell en 1914 !!!!

Fig. 2.3. Joseph Barrell, Professor of Geology at Yale University. Portrait reproduced from Anonymous (1919). Reproduced with permission of the American Journal of Science.

Fig. 2.4. Schematic vertical section of the outer layers of the Earth, to show the nature of the "undertow" in the asthenosphere that is necessary to restore isostatic equilibrium after modification of the lithosphere by uplift and erosion. Reproduced from Fig. 14 of Barrell (1914f) with permission of the University of Chicago Press.

Illustrations tirées de Watts, « Isostasy and flexure of the lithosphere, Cambridge, 2001

Joseph BARRELL (1869-1919)

Lithosphère – Asthénosphère en 1914 (suite)

Joseph Barrell prévoit même dès 1914 la nécessité de mouvements latéraux dans l'asthénosphère pour accommoder les soulèvements et enfoncements de la lithosphère!!!!

Fig. 2.4. Schematic vertical section of the outer layers of the Earth, to show the nature of the “undertow” in the asthenosphere that is necessary to restore isostatic equilibrium after modification of the lithosphere by uplift and erosion. Reproduced from Fig. 14 of Barrell (1914f) with permission of the University of Chicago Press.

- **« Bien que la comparaison des continents et des bassins océaniques montrent un haut degré de corrélation isostatique, il n’y a pas ou peu d’ajustement dans des régions de diamètres inférieur à 200-300 km. Les montagnes individuellement pourraient se dresser du fait de la rigidité de la croûte . »**

J. Barrell, « The strength of the Earth crust », 1914

Lithosphère-Asthénosphère au sens de Barrell

Fig. 18 de Barrell (1914) : Distribution des contraintes tectoniques supportées en profondeur par une Terre élastique en réponse à des charges s'écartant du modèle isostatique local (volcans, deltas, ...). La lithosphère est la partie capable de supporter des contraintes « importantes »

Félix Vening-Meinesz (1887-1966) et l'isostasie régionale au sens de la flexure

Fig. 2.10. Felix Andries Vening Meinesz, Hoofd-Curator van het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut, with a pendulum apparatus. Photo courtesy of the late B. J. Collette of the Vening Meinesz laboratorium, Rijksuniversiteit, Utrecht.

Fig. 2.12. The flexure of an elastic plate by a concentrated load P based on the formula of Hertz (1884); r is the radial distance from the load and β is a measure of the flexural strength of the plate. Vening Meinesz defined the value $r = 2.905\beta$ as the radius of regionality, R .

Fig. 2.11. Schematic diagram illustrating the local and regional models for compensation of a topographic load.

L'isostasie régionale à l'heure de la tectonique des plaques

Exemple tiré du sujet de CAPES SVT 2010!!!

*Figurait dans mes cours bien avant
et je n'ai pas posé le sujet ... alors que j'étais au jury !!*

La notion de plaque lithosphérique élastique et les enveloppes rhéologiques

Fig. 4.15. Simple model for the gravity anomaly and flexure of the lithosphere at a seamount or oceanic island.

Isostasie et épaisseur crustale : un modèle de type AIRY

Une représentation plus complète pour rappeler la différence entre **niveau de compensation gravimétrique** ou niveau d'équilibre du contraste de densité (MOHO) ... et **zone de compensation mécanique** qui permet le mouvement ductile sous la lithosphère

Isostasie et subsidence thermique : un modèle de type PRATT

Eau peu dense qui
«compense» le
poids de la
lithosphère

Plus froid et
plus dense

Niveau de
compensation

L'équilibre des colonnes donne:

$$(w + hl)\rho_a = w\rho_w + \int_0^{hl} \rho(z) dz$$

Retour à la lithosphère continentale : « Jelly sandwich or Crème brûlée » ?

La controverse des années 2000-2010

James Jackson et la « crème brûlée »

Strength of the continental lithosphere: Time to abandon the jelly sandwich?

James Jackson, University of Cambridge, Department of Earth Sciences, Bullard Laboratories, Madingley Road, Cambridge CB3 0EZ, UK, jackson@esc.cam.ac.uk

GSA TODAY 2002

Ou le retour du « jelly sandwich »

The long-term strength of continental lithosphere: “jelly sandwich” or “crème brûlée”?

E.B. Burov, *Laboratoire de Tectonique, University of Paris 6, 4 Place Jussieu, 75252 Paris Cedex 05, France, evgenii.burov@lgs.jussieu.fr*, and A.B. Watts, *Department of Earth Sciences, University of Oxford, Parks Road, Oxford OX1 3PR, UK, tony.watts@earth.ox.ac.uk*

GSA Today 2006

QUELQUES CONCLUSIONS

- **Les modèles d'isostasie ont été des solutions élégantes proposées au problème géodésique soulevé par Bouguer**
- **L'existence des deux modèles de Pratt et Airy est liée à l'acceptation ou non d'une croûte mince plus rigide flottant sur une enveloppe fluide et dense.**
- **Le modèle d'Airy a été un argument crucial pour la théorie de Wegener et on peut mettre en relation l'opposition Pratt-USA vs Airy-Europe avec la « géographie » du rejet de la « dérive des continents »**
- **Les trois modèles historiques (Airy, Pratt et Vening-Meinez) sont complémentaires et ont trouvé leur place dans la tectonique des plaques**
- **Si le modèle mécanique de la lithosphère océanique est bien admis, il existe encore des controverses sur les contributions respectives de la croûte et du manteau à la rigidité de la lithosphère continentale**

La « lithosphère élastique »

Age de la lithosphère océanique (Ma)
Au moment de sa mise en charge

Des lithosphères différentes suivant les constantes de temps

L' «Epaisseur Elastique Equivalente» de la lithosphère ne correspond qu'à une partie de la lithosphère thermique et sismologique !!!!

Lithosphère
élastique
« géologique »

Long-
Term
Mechanical
Thickness

Short-
Term
Mechanical
Thickness

Lithosphère
sismologique
Et thermique

Classe de terrain, investigation, jeux ...

Un bilan de recherche pour concevoir des démarches innovantes

Colloque AFPSVT – 14 janvier 2014

Michèle Prieur & Eric Sanchez, EducTice-S2HEP, IFE ENS de Lyon

-
1. La classe de terrain, modalité pédagogique
 2. Articuler recherche et pratique pour concevoir des classes de terrain innovantes
 3. Classe de terrain : démarche et outils pour l'investigation scientifique
 4. Perspectives

1. La classe de terrain, modalité pédagogique

La classe de terrain : une attente institutionnelle

Programme classe terminale de la série scientifique

n° 8, 13 octobre 2011

Sortie géologique

« une pédagogie active fondée sur le concret »

→ *« la démarche d'investigation »*

→ *« l'approche de la complexité des situations réelles », « des activités pratiques réelles »*

→ *« construction des compétences »*

Thème : Le domaine continental et sa dynamique

« Recenser, extraire et organiser des données de terrain entre autres lors d'une sortie »

Le terrain comme lieu d'apprentissage : une innovation ?

- **La classe de terrain - Programme première S**
(BO, 2002)
 - Des activités inscrites dans le cadre d'une démarche scientifique
 - Accès au réel

- *“passans par quelques prez ou autres lieux herbus, visitoyent les arbres et plantes, et en emportoient leurs pleines mains au logis »*

F. Rabelais, 1534

- Ponocrates promeut une méthode d'enseignement qui le conduit à effectuer des promenades avec son élève Gargantua

Enquête (2005) : la classe de terrain dans l'enseignement des sciences de la Terre

Objectifs et pratiques des enseignants

- Conduire une démarche d'investigation
- Construire des connaissances
- Travail de groupe
- Formation technique

des paradoxes

La classe de terrain pour :

- « se confronter au réel », « découvrir »

Sanchez E., Prieur M., Fontanieu V. (2005) L'enseignement des sciences de la Terre : Que font les élèves sur le terrain ? *XXVIèmes JIES*. Chamonix

Un risque...

Un prof

Un objet géologique

Des élèves qui prennent des notes

...un cours magistral en "plein air"

New York Times No. 306-NT-520A-6 in National Archives

“To-day’s Aerial Geography Lesson”

2. Articuler recherche et pratique pour innover (2005 – 2014)

Une recherche *fondamentale finalisée*

- Articuler recherche et pratique
- Approche systémique des situations d'apprentissage

Une méthodologie de type *Design based research*

Wang, F., & Hannafin, M. J. (2005). Design-based research and technology-enhanced learning environments. Educational Technology Research and Development. *Educational Technology Research and Development*, 53(4), 5-23.

DBR : une collaboration chercheur - enseignant

- Co-conception et co-analyse des données
- Vers des praxéologies partagées
- Des enseignants associés à l'IFE – Des LÉA
- Des enseignants chargés d'étude : *brokers*

INSTITUT FRANÇAIS DE L'ÉDUCATION

INSTITUT

RECHERCHE

RESSOURCES ET SERVICES

PARTENARIAT

LES LIEUX D'ÉDUCATION ASSOCIÉS (LEA)

Vous êtes ici : [Accueil](#)

Le réseau

DE NOUVEAUX ESPACES POUR LA RECHERCHE EN ÉDUCATION

DE NOUVEAUX ESPACES POUR LA RECHERCHE EN ÉDUCATION

DBR : Expérimentations

- Observation classe
- Traçage
- Focus group
- Questionnaire

DBR : un processus itératif

DBR : objectifs

Pragmatique

Innovation

Formation

Heuristique

3. Classe de terrain : démarches et outils pour l'investigation scientifique

Modèle et investigation scientifique

Réel

Théorie

modèle

- Un intermédiaire entre théorie et réel (Bunge 1975, Walliser 1977, Bachelard 1979)
- Un outil pour l'investigation scientifique (Orange 1997, Halloun 2006)

Le scénario d'une classe de terrain

En quoi les Alpes sont elles une chaîne de collision ?

Préparation

2h

Terrain

2 jours

Exploitation

Séance 1 : préparer la classe de terrain

Conception du
protocole

Analyse du modèle

Analyse du modèle et conception d'un protocole d'observation

- Identifier les caractéristiques et les propriétés d'un modèle de chaîne de collision

Plongement de la lithosphère : → métamorphisme MP-BT et HP-BT

- Faire des prévisions sur les traces observables

*Roches et minéraux : → SB, éclogite
Auréoles réactionnelles*

Séance 2 : la classe de terrain

Des activités de terrain diversifiées

Séance 3 : Exploitation classe de terrain

Traiter et confronter les données au modèle pour l'instancier et identifier des limites

Informations

Titre : Minéraux reliques

Source : vide

Commentaire : On peut voir du pyroxène entouré de glaucophane. Ce qui indique que le pyroxène (qui se forme en Basse-Température et Basse-Pression) a été formé avant le glaucophane qui lui se forme en Basse-température et Moyenne-Pression. La pression étant liée à la profondeur, on remarque alors que la lithosphère a plongé.

Sanchez, E. (2008). Quelles relations entre modélisation et investigation scientifique dans l'enseignement des sciences de la Terre ? *Education & Didactique*, 2(2), 97-122.

Le numérique pour la classe de terrain (2005)

- **Recueil – analyse de données**
- **Espace**
échelle, orientation, référentiel, 3D/2D, géolocalisation

Le numérique pour la classe de terrain (2005- 2014)

Nomadisme – Intégration

2005 -2014 : de l'observatoire des pratiques géomatiques à Geomedia.lab

Observatoire des pratiques géomatiques (2005-2012)

Réflexion sur les usages et les enjeux des outils géomatiques dans l'enseignement secondaire

Geomedia.lab

Incubateur d'innovations techno-pédagogiques en lien avec l'usage des géomedias

<http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/recherche/geomatique>

4. Perspectives pour la classe de terrain

Complexité et apprentissage

Articuler les disciplines par une approche codisciplinaire

Prieur, M., Sanchez, E.,
Aldon, G. (2011)

Aldon G., Monod-Ansaldi R., Prieur
M. (à paraître)

La codisciplinarité pour appréhender la complexité des objets géologiques

- Géologie - biologie – botanique...
- SVT, maths, SPC, géographie...

JENO .lab

Agence Nationale de la Recherche
ANR

Apprentissage avec les jeux épistémiques numériques

- Jeu play : situations d'apprentissage ludiques
 - Résolution de problèmes complexes
 - Approche par compétences
- Jeu de pistes pour la classe de terrain au lycée (tablettes numériques)

JENO .lab

Agence Nationale de la Recherche
ANR

Jeux épi-techniques (jeu play)
Apprentissage avec les jeux épistémiques numériques
Complexes Technologies-Méthodologies
ces

- Concevoir 3 Jeux Epistémiques Numériques (JEN)
- Concevoir un modèle de JEN (dimensions techniques et pédagogiques)
- Développer une méthodologie originale (design-based research & traces numériques d'apprentissage)

Développer des jeux épistémiques numériques

Situations d'apprentissage ludiques (jeu play)
Résolution de problèmes complexes
Approche par compétences

Social Sciences and Humanities
Research Council of Canada

Conseil de recherches en
sciences humaines du Canada

Sanchez, E, Lison, C, & Kramar, N. (2013). *Digital Play and Epistemological Belief Changes: A Case Study about Sustainable Development*. Paper presented at the ESERA 2013, Cyprus.